

## 附件 2

# 安尔眠胶囊等 36 种非处方药说明书范本

## 安尔眠胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：安尔眠胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]安神。用于神经衰弱和失眠。

[规格]每粒装 0.36 克

[用法用量]口服。一次 4~6 粒，一日 3 次。

[不良反应]

[禁忌]外感发热患者忌服。

[注意事项]

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。
2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。
3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者慎用，并应在医师指导下使用。
5. 本品宜餐后服。
6. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

# 安乐胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：安乐胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]舒肝解郁，安神。用于精神抑郁、失眠、胸闷不适、纳少神疲，对更年期综合征者亦可使用。

[规格]每粒装 0.6 克

[用法用量]口服，一次 2~3 粒，一日 3 次。

[不良反应]

[禁忌]

[注意事项]

1. 少吃生冷及油腻难消化的食品。
2. 服药期间要保持情绪乐观，切忌生气恼怒。
3. 孕妇慎用。
4. 火郁证者不适用，主要表现为口苦咽干、面色红赤、心中烦热、胁胀不眠、大便秘结。
5. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
7. 儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 肠炎宁丸说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：肠炎宁丸

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]清热利湿，行气。用于急、慢性胃肠炎，腹泻，小儿消化不良。

[规格]每9丸重1.44克

[用法用量]口服。一次9丸，一日3~4次；小儿酌减。

[不良反应]

[禁忌]孕妇禁用。

[注意事项]

1. 饮食宜清淡，忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻时应去医院就诊。
4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
5. 症状严重或有里急后重、脓血便的患者应及时去医院就诊。
6. 服药3天症状无缓解，应去医院就诊。
7. 儿童、哺乳期妇女及年老体弱者应在医师指导下服用。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 复方鱼腥草软胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：复方鱼腥草软胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]清热解毒。用于外感风热引起的咽喉肿痛；急性咽炎、扁桃腺炎有风热症候者。

[规格]每粒装 0.52 克

[用法用量]口服，一次 2~3 粒，一日 3 次。

[不良反应]个别病例出现咽干、胃灼热、心悸、手发抖等，均较轻微，一般不影响继续服药。

[禁忌]

[注意事项]

1. 忌烟酒，忌辛辣、刺激性及鱼腥食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
4. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者慎用，并应在医师指导下使用。
5. 扁桃体有化脓或发热体温超过 38.5℃ 的患者应去医院就诊。
6. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 感咳双清胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：感咳双清胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]清热解毒。用于急性上呼吸道感染、急性支气管炎肺火炽盛者，症见发热、咳嗽、咽痛、头痛、鼻塞、舌尖边红、苔薄黄。

[规格]每粒装 0.3 克（含黄芩苷 150 毫克，穿心莲内酯 37.5 毫克）

[用法用量]口服。一次 2 粒，一日 3 次。

[不良反应]偶见便秘。

[禁忌]

[注意事项]

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 脾胃虚寒者慎服。
4. 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。
5. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
6. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱者慎用，并应在医师指导下使用。
7. 服药期间，若患者发热体温超过 38.5℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重、痰量明显增多、或扁桃体有化脓者应去医院就诊。
8. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 儿童必须在成人监护下使用。
12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 感冒胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：感冒胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]清热止咳、宣肺平喘。用于感冒、头痛发热、咳嗽痰黄、气逆喘急等。

[规格]每粒装 0.6 克

[用法用量]口服。一次 3 粒，一日 2 次。

[不良反应]

[禁忌]

[注意事项]

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。
4. 虚喘者不适用。其表现为咳声低弱，动则气喘气短，自汗怕风。
5. 孕妇慎用。儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下使用。
6. 运动员慎用。
7. 高血压、心脏病及失眠、心悸患者慎用。有肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
8. 合并有肺部感染、肺结核、支气管癌、支气管肺炎或其他肺部疾病患者应去医院就诊。支气管扩张、肺心病患者出现咳嗽时亦应去医院就诊。
9. 服药期间，若患者发热体温超过 38.5℃，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。
10. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
11. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
12. 本品性状发生改变时禁止使用。
13. 儿童必须在成人监护下使用。
14. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
15. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 感冒颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：感冒颗粒

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]清热止咳，宣肺平喘。用于感冒、头痛发热、咳嗽痰黄、气逆喘急等。

[规格]每袋装 5 克

[用法用量]开水冲服。一次 1 袋，一日 2 次。

[不良反应]

[禁忌]

[注意事项]

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
3. 风寒感冒者不适用，其表现为恶寒重，发热轻，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，喉痒咳嗽。
4. 虚喘者不适用。其表现为咳声低弱，动则气喘气短，自汗怕风。
5. 孕妇慎服。儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下使用。
6. 运动员慎用。
7. 高血压、心脏病及失眠、心悸患者慎用。糖尿病患者及有肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
8. 合并有肺部感染、肺结核、支气管癌、支气管肺炎或其他肺部疾病患者应去医院就诊。支气管扩张、肺心病患者出现咳嗽时亦应去医院就诊。
9. 服药期间，若患者发热体温超过 38.5℃，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。
10. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
11. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
12. 本品性状发生改变时禁止使用。
13. 儿童必须在成人监护下使用。
14. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
15. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

# 固本益肠胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：固本益肠胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]健脾温肾，涩肠止泻。用于脾虚或脾肾阳虚所致慢性泄泻，症见慢性腹痛腹泻、大便清稀、食少腹胀、腰酸乏力、形寒肢冷。

[规格]每粒装 0.5 克

[用法用量]口服，一次 4 粒，一日 3 次。30 天为一疗程，连服二至三个疗程。

[不良反应]

[禁忌]泄泻时腹部热胀痛者忌服。

[注意事项]

1. 服药期间忌食生冷、辛辣、油腻食物。
2. 湿热下痢非本方所宜。
3. 服药 3 天症状未改善，或症状加重，或出现新的症状者，应立即停药并去医院就诊。
4. 有慢性结肠炎、溃疡性结肠炎便脓血等慢性病史者，患泄泻后应在医师指导下使用。
5. 孕妇、哺乳期妇女、老年患者应在医师指导下使用。
6. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
7. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。
8. 服药超过 1 个疗程应咨询医师，并应在医师指导下使用。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 儿童必须在成人监护下使用。
12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系



## 归芪生血颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：归芪生血颗粒

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]健脾益肾，调畅气血。适用于脾肾不足，气血亏虚，肌肤失养所致颜面皮肤枯燥干黄、弹性降低、皮肤松弛等症。

[规格]每袋装 6 克

[用法用量]开水冲服，一次 1 袋，一日 3 次，一个月为 1 个疗程。

[不良反应]

[禁忌]妊娠期妇女禁用。

[注意事项]

1. 忌不易消化食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 儿童不宜使用。哺乳期妇女、老人应在医师指导下服用。
4. 大便溏软的患者慎用。
5. 月经过多或经期延长者慎用。
6. 肝病、甲状腺功能低下、中重度贫血、出血性疾病以及高血压、心脏病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
7. 突发皮肤黏膜发黄或伴有头晕、心悸、乏力等其他全身症状者，应及时去医院就诊。
8. 如服药期间出现不适症状者应及时去医院就诊。
9. 服药 1 个月症状无缓解，应去医院就诊。
10. 应按照本品疗程服用，不宜将其作为保健或预防衰老或美容的药品而长期服用。
11. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
12. 本品性状发生改变时禁止使用。
13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 黄芪精说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：黄芪精

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治] 补血养气，固本止汗。用于气虚血亏、表虚自汗、四肢乏力、精神不足或久病衰弱、脾胃不壮。

[规格] 每支装 10 毫升（无糖型）

[用法用量] 口服，一次 10 毫升（1 支），一日 2 次，早晚服用。

[不良反应]

[禁忌]

[注意事项]

1. 忌油腻食物。
2. 感冒病人不宜服用。
3. 本品宜饭前服用。
4. 按照用法用量服用，小儿、孕妇、高血压患者应在医师指导下服用。
5. 服药 2 周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用] 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 健脑片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：健脑片

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]健脑益智，安眠补身。用于用脑过度、记忆衰退、神经衰弱、头晕目眩、惊悸失眠、心烦易倦、畏寒体虚、身亏腰痛等症。

[规格]每片重 0.35 克

[用法用量]口服。一次 2 片，一日 3 次。

[不良反应]

[禁忌]孕妇禁用。

[注意事项]

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。
4. 儿童应在医师指导下服用。
5. 服药 2 周症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 健脾安神胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：健脾安神胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]健脾渗湿，补中，宁心安神。用于脾虚湿滞，食欲不振，失眠、健忘、心悸等，以及单纯性消化不良，神经衰弱具有上述症候者。

[规格]每粒装 0.15 克

[用法用量]口服，一次 2 粒，一日 3 次。

[不良反应]

[禁忌]

[注意事项]

1. 饮食宜清淡，忌酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 忌愤怒、忧郁，保持心情舒畅。
3. 孕妇及哺乳期妇女慎用。年老体弱者应在医师指导下服用。
4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
5. 小儿用法用量，请咨询医师或药师。
6. 服药 3 天症状无改善，或出现其他症状时，应立即停用并到医院诊治。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]密封。

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 抗感片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：抗感片

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]清热解毒。用于外感风热引起的感冒，症见发热、头痛、鼻塞、喷嚏、咽痛、全身乏力、酸痛。

[规格]每片重 0.6 克

[用法用量]口服。一次 4 片，一日 3 次；小儿酌减或遵医嘱。

[不良反应]腹泻。

[禁忌]

[注意事项]

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 风寒感冒者不适用。
4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
5. 孕妇慎服；儿童、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。
6. 发热体温超过 38.5℃ 的患者，应去医院就诊。
7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 口腔溃疡含片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：口腔溃疡含片

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]消溃止痛。用于复发性口腔溃疡。

[规格]每片重 0.3 克

[用法用量]含服，一次 1 片，一日 2~3 次。

[不良反应]可见口腔粘膜及溃疡面局部刺激、胃肠不适。

[禁忌]

[注意事项]

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。
2. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
3. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者慎用，并应在医师指导下使用。
4. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
5. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
6. 本品性状发生改变时禁止使用。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 妙济丸说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：妙济丸

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]强筋壮骨，祛湿通络，活血止痛。用于四肢麻木拘挛、骨节疼痛、腰腿酸软。

[规格]每袋装 2.5 克（每 20 丸重 1 克）

[用法用量]用黄酒送服。一次 1~2 袋，一日 2 次。

[不良反应]

[禁忌]孕妇禁用。

[注意事项]

1. 忌生冷食物，避风寒。
2. 感冒发热病人不宜服用。
3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
4. 妇女经期慎用。儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
5. 服药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 耆鹿逐痹胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：耆鹿逐痹胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]益气养阴，补肾健骨，活血祛风。主治久痹之气阴两虚，肝肾不足。证见：关节肿痛、屈伸不利、气短乏力、腰膝酸软、午后潮热、自汗盗汗。

[规格]每粒装 0.33 克

[用法用量]口服。每次 3 粒，每日 2 次，或遵医嘱。一个月为 1 疗程。

[不良反应]腹泻、口干。

[禁忌]孕妇忌服。

[注意事项]

1. 忌油腻食物。
2. 凡脾胃虚弱，呕吐泄泻，腹胀便溏、咳嗽痰多者慎用。
3. 服用本品同时不宜服用藜芦、五灵脂、皂荚或其制剂；不宜喝茶和吃萝卜，以免影响药效。
4. 感冒病人不宜服用。
5. 服药期间，病变部位忌接触凉水，注意摄取营养和休息。
6. 本品宜饭前服用。
7. 按照用法用量服用，经期妇女慎用。儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
8. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
9. 服药 2 周或服药期间症状无改善，或症状加重，或出现新的严重症状，应立即停药并去医院就诊。
10. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
11. 本品性状发生改变时禁止使用。
12. 儿童必须在成人监护下使用。
13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系



## 清开灵胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：清开灵胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]清热解毒，镇静安神。用于外感风热所致发热、烦躁不安、咽喉肿痛，以及上呼吸道感染、病毒性感冒、急性咽炎见上述证候者。

[规格]每粒装 0.40 克（含黄芩甙 20 毫克）

[用法用量]口服。一次 1~2 粒，一日 3 次，儿童酌减或遵医嘱。

[不良反应]胃脘不适，腹泻。

[禁忌]孕妇禁用。

[注意事项]

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 风寒感冒者不适用。久病体虚患者如出现腹泻时慎用。
4. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
5. 儿童、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者应在医师指导下服用。
6. 发热体温超过 38.5℃ 的患者，应去医院就诊。
7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 舒脑欣滴丸说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：舒脑欣滴丸

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治] 理气活血、化瘀止痛。用于血虚血瘀引起的偏头痛，症见头痛、头晕、视物昏花、健忘、失眠等。

[规格] 每丸重 42 毫克

[用法用量] 口服。一次 4 粒，一日 3 次。

[不良反应]

[禁忌]

1. 脑溢血患者禁服。
2. 孕妇禁用。

[注意事项]

1. 忌烟、酒及辛辣、油腻食物。
2. 保持情绪稳定，切忌生气恼怒及焦虑。
3. 本品为偏头痛的对症治疗药，用药后症状未缓解或症状严重者应及时去医院就诊。有动脉硬化、脑梗塞或中风、中风后遗症等脑血管疾病所致头痛的患者应去医院就诊。
4. 烦躁、易怒、肝火旺盛者慎服。
5. 有出血性疾病的患者不宜使用。
6. 高血压头痛及不明原因的头痛，应去医院就诊。
7. 儿童、经期及哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
8. 有心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
9. 头痛、头晕症状严重者，应及时去医院就诊。
10. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
11. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
12. 本品性状发生改变时禁止使用。
13. 儿童必须在成人监护下使用。
14. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
15. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 西帕依固龈泡腾片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：西帕依固龈泡腾片

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]健齿固龈，清血止痛。用于牙周疾病引起的牙齿酸软、咀嚼无力、松动移位、牙龈出血，以及口舌生疮，咽喉肿痛，口臭烟臭。

[规格]每片重 0.6 克

[用法用量]每次取 1 片，加 15 毫升温开水溶解，漱口，一次约 3~5 毫升，一日 3~5 次。

[不良反应]

[禁忌]

[注意事项]

1. 本品溶解后仅供含漱用，请勿直接吞服本品。含漱后应吐出，不得咽下。
2. 忌烟、酒及辛辣食物。
3. 以牙龈出血为主症者，应排除血液系统疾患后方可使用。
4. 按照用法用量使用，小儿、年老体弱者应在医师指导下使用。
5. 用药时应注意口腔卫生，并配合牙周治疗以增加疗效。
6. 本品不宜作为防治口臭的保健品而长期使用。
7. 用药期间症状加重者应及时去医院就诊。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人的监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 小儿解感颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：小儿解感颗粒

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]清热解表，消炎止咳。用于感冒发烧、头痛鼻塞、咳嗽喷嚏、咽喉肿痛。

[规格]每袋装 2 克

[用法用量]开水冲服。一至三岁小儿，一次 1 克，四至六岁，一次 2 克，九至十四岁，一次 3 克，一日 3 次，或遵医嘱。

[不良反应]

[禁忌]

[注意事项]

1. 忌辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 风寒感冒者不适用。
4. 婴儿应在医师指导下服用。
5. 糖尿病患者、脾虚易腹泻者应在医师指导下服用。
6. 发热体温超过 38.5℃ 的患者，应去医院就诊。
7. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
8. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
9. 本品性状发生改变时禁止使用。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 小儿消食咀嚼片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：小儿消食咀嚼片

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]消食化滞，健脾和胃。用于脾胃不和、消化不良、食欲不振、便秘、食滞、疳积。

[规格]每片重 0.3 克

[用法用量]咀嚼后吞服，一岁至三岁一次 2~4 片，三岁至七岁一次 4~6 片，一日 3 次；成年人一次 6~8 片，一日 3 次。

[不良反应]

[禁忌]

[注意事项]

1. 忌食生冷辛辣食物。
2. 婴幼儿应在医师指导下使用。
3. 脾虚泄泻,大便溏薄, 次数多者应慎用或不用。
4. 按照用法用量服用, 服药 1 周症状不改善或服药期间症状加重者应及时就医。
5. 长期厌食, 体弱消瘦者, 应去医院就诊。
6. 对本品过敏者禁用, 过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 10.如正在使用其他药品, 使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用, 详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 一清软胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：一清软胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]清热燥湿，泻火解毒。用于热毒所致的身热烦躁，目赤口疮，咽喉、牙龈肿痛，大便秘结等症及咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述症候者。

[规格]每粒装 0.65 克

[用法用量]口服，一次 4 粒，一日 3~4 次。

[不良反应]偶见皮疹、恶心、腹泻、腹痛。

[禁忌]

[注意事项]

1. 忌烟、酒及辛辣食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
4. 出现腹泻时可酌情减量。
5. 扁桃体有化脓或发热体温超过 38.5℃ 的患者应去医院就诊。
6. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、年老体弱及脾虚便溏者慎用，并应在医师指导下使用。
7. 严格按用法用量服用，本品不宜长期服用。
8. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 儿童必须在成人监护下使用。
12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 依马打正红花油说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：依马打正红花油

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]活血散寒，消肿止痛。用于风湿骨痛、腰酸腿痛、头风胀痛、扭伤瘀肿、跌打伤痛、蚊叮虫咬。

[规格]每瓶装 12 毫升

[用法用量]外用擦于患处。

[不良反应]

[禁忌]

1. 孕妇及婴儿忌用。
2. 对破损或敏感皮肤小心慎用。

[注意事项]

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 忌食生冷、油腻食物。
3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。有出血倾向者慎用。
4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。
5. 用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。
6. 用药 3 天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状时应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 依马打正红花油说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：依马打正红花油

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]活血散寒，消肿止痛。用于风湿骨痛、腰酸腿痛、头风胀痛、扭伤瘀肿、跌打伤痛、蚊叮虫咬。

[规格]每瓶装 25 毫升

[用法用量]外用擦于患处。

[不良反应]

[禁忌]

1. 孕妇及婴儿忌用。
2. 对破损或敏感皮肤小心慎用。

[注意事项]

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 忌食生冷、油腻食物。
3. 切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。有出血倾向者慎用。
4. 经期及哺乳期妇女慎用。儿童、年老体弱者应在医师指导下使用。
5. 用药后皮肤过敏者应停止使用，症状严重者应去医院就诊。
6. 用药 3 天症状无缓解，或出现局部红肿、疼痛、活动受限等不适症状时应去医院就诊。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系



## 茵花洗液说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：茵花洗液

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]清热除湿，杀虫止痒。适用于妇女带下量多、阴部瘙痒等症。

[规格]每瓶装 100 毫升

[用法用量]外用，每次 10 毫升，加冷开水稀释至 100 毫升后擦洗外阴。

[不良反应]

[禁忌]阴道有破损者及经期、孕期妇女禁用。

[注意事项]

1. 本品为外用药，禁止内服。
2. 用毕洗手，切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。
3. 忌食高蛋白、酸辣、生冷、油腻、酒类等刺激食物。
4. 治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。
5. 未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。
6. 外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。
7. 带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。
8. 用药部位如有烧灼感等不适时应停药，严重者应向医师咨询。
9. 注意卫生，防止重复感染。用药前应先用温开水清洗外阴。
10. 用药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。
11. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
12. 本品性状发生改变时禁止使用。
13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 茵花洗液说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：茵花洗液

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]清热除湿，杀虫止痒。适用于妇女带下量多、阴部瘙痒等症。

[规格]每瓶装 250 毫升

[用法用量]外用，每次 10 毫升，加冷开水稀释至 100 毫升后擦洗外阴。

[不良反应]

[禁忌]阴道有破损者及经期、孕期妇女禁用。

[注意事项]

1. 本品为外用药，禁止内服。
  2. 用毕洗手，切勿接触眼睛、口腔等黏膜处。皮肤破溃处禁用。
  3. 忌食高蛋白、酸辣、生冷、油腻、酒类等刺激食物。
  4. 治疗期间忌房事，配偶如有感染应同时治疗。
  5. 未婚或绝经后患者，应在医师指导下使用。
  6. 外阴白色病变、糖尿病所致的瘙痒不宜使用。
  7. 带下伴血性分泌物，或伴有尿频、尿急、尿痛者，应去医院就诊。
  8. 用药部位如有烧灼感等不适时应停药，严重者应向医师咨询。
  9. 注意卫生，防止重复感染。用药前应先用温开水清洗外阴。
  10. 用药 7 天症状无缓解，应去医院就诊。
  11. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
  12. 本品性状发生改变时禁止使用。
  13. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
  14. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
- [药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

# 止嗽立效胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：止嗽立效胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治] 止嗽，定喘，祛痰。用于风寒咳嗽、喘急气促。

[规格] 每粒装 0.31 克

[用法用量] 口服。一次 3 粒，一日 2 次，7 天一疗程。

[不良反应] 偶见胃部不适，一般不影响继续治疗。

[禁忌] 儿童禁用。孕妇禁用。

[注意事项]

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 本品宜在发病初期（72 小时内）使用。
4. 虚喘者不适用。其表现为咳声低弱，动则气喘气短，自汗怕风。
5. 运动员慎用。
6. 合并有肺部感染、肺结核、支气管癌、支气管肺炎或其他肺部疾病患者应去医院就诊。支气管扩张、肺心病患者出现咳嗽时亦应去医院就诊。
7. 高血压、心脏病及失眠、心悸患者慎用。肝肾疾病患者慎用。有糖尿病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
8. 哺乳期妇女、年老体弱者慎用，并应在医师指导下使用。
9. 服药期间，若患者发热体温超过 38.5℃，或喘甚，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。
10. 严格按用法用量服用，本品含有罂粟壳，不宜常服。
11. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
12. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
13. 本品性状发生改变时禁止使用。
14. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
15. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

# 止嗽立效片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

[药品名称]

通用名称：止嗽立效片

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]止嗽，定喘，祛痰。用于风寒咳嗽、喘急气促。

[规格] 每片重 0.53 克

[用法用量] 口服，一次 2 片，一日 2 次，7 天一疗程。

[不良反应] 偶见胃部不适，一般不影响继续治疗。

[禁忌] 儿童禁用。孕妇禁用。

[注意事项]

1. 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。
2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
3. 本品宜在发病初期（72 小时内）使用。
4. 虚喘者不适用。其表现为咳声低弱，动则气喘气短，自汗怕风。
5. 运动员慎用。
6. 合并有肺部感染、肺结核、支气管癌、支气管肺炎或其他肺部疾病患者应去医院就诊。支气管扩张、肺心病患者出现咳嗽时亦应去医院就诊。
7. 高血压、心脏病及失眠、心悸患者慎用。肝肾疾病患者慎用。有糖尿病等慢性病严重者在医师指导下服用。
8. 哺乳期妇女、年老体弱者慎用，并应在医师指导下使用。
9. 服药期间，若患者发热体温超过 38.5℃，或喘甚，或咳嗽加重、痰量明显增多者应去医院就诊。
10. 严格按用法用量服用，本品含有罂粟壳，不宜常服。
11. 用药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
12. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
13. 本品性状发生改变时禁止使用。
14. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
15. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用] 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 众生胶囊说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：众生胶囊

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[功能主治]清热解毒，活血凉血，消炎止痛。用于上呼吸道感染，急、慢性咽喉炎，急性扁桃腺炎，疮毒等症。

[规格]每粒装 0.45 克

[用法用量]口服，一次 2~3 粒，一日 3 次；外用，取胶囊内容物用冷水调匀，涂于患处。

[不良反应]

[禁忌]

[注意事项]

1. 忌烟酒、辛辣、鱼腥食物。
  2. 不宜在服药期间同时服用滋补性中药。
  3. 孕妇慎用。脾虚大便溏者慎用。
  4. 儿童、哺乳期妇女、年老体弱者应在医师指导下服用。
  5. 有高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
  6. 属风寒感冒咽痛者，症见恶寒发热、无汗、鼻流清涕者慎用。
  7. 扁桃体有化脓或发热体温超过 38.5℃ 的患者应去医院就诊。
  8. 服药 3 天症状无缓解，应去医院就诊。
  9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
  10. 本品性状发生改变时禁止使用。
  11. 儿童必须在成人监护下使用。
  12. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
  13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
- [药物相互作用]如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 多潘立酮口腔崩解片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

### [药品名称]

通用名称：多潘立酮口腔崩解片

商品名称：

英文名称：

汉语拼音：

### [成份]

### [性状]

[作用类别] 本品为胃肠促动力药类非处方药药品。

[适应症] 用于消化不良、腹胀、嗝气、恶心、呕吐、腹部胀痛。

[规格]10 毫克

[用法用量] 本品不需用水或只需少量水，也无需咀嚼，药物置于舌面，迅速崩解后，借吞咽动作入消化道起效。成人常用口服剂量为每次 1 片（10 毫克），每日 3 次，饭前 15~30 分钟或就寝时服用。

### [不良反应]

1. 偶见口干、头痛、失眠、神经过敏、头晕、嗜睡、倦怠、腹部痉挛、腹泻、反流、恶心、胃灼热感、皮疹、瘙痒、荨麻疹、口腔炎、结膜炎等。
2. 有时导致血清泌乳素水平升高、溢乳、男子乳房女性化、女性月经不调等，但停药后即可恢复正常。
3. 有研究提出日剂量超过 30 毫克以及年龄大于 60 岁的患者中，发生严重室性心率失常或心源性猝死的风险可能升高。

### [禁忌]

1. 机械性梗阻、胃肠道出血、胃肠道穿孔患者禁用。
2. 分泌催乳素的垂体肿瘤（催乳素瘤）、嗜铬细胞瘤、乳癌患者禁用。
3. 禁止与酮康唑口服制剂合用。

### [注意事项]

1. 孕妇慎用，哺乳期妇女使用本品期间应停止哺乳。
2. 建议儿童使用多潘立酮混悬液。
3. 由于多潘立酮主要在肝脏代谢，故肝功能损害的患者慎用。
4. 老年患者应在医师指导下使用。
5. 心脏病患者（如心律失常、充血性心衰等）以及接受化疗的肿瘤患者、电解质明显紊乱的患者应用时需慎重，有可能加重心律失常。
6. 肾功能不全患者应在医师指导下使用。
7. 正在使用洋地黄和氨茶碱的患者慎用本品。
8. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

### [药物相互作用]

1. 不宜与唑类抗真菌药如酮康唑、伊曲康唑，大环内酯类抗生素如红霉素，HIV 蛋白酶抑制剂类抗艾滋病药物及奈法唑酮等合用。
2. 抗胆碱能药品如痛痉平、溴丙胺太林、山莨菪碱、颠茄片等会减弱本品的作用，不宜与本品同服。

3. 抗酸药和抑制胃酸分泌的药物可降低本品的生物利用度，不宜与本品同服。
4. 本品与对乙酰氨基酚、氨苄西林、左旋多巴、四环素等同用时，会使这些药物的吸收率增加。
5. 本品与地高辛合用时会使后者的吸收减少。
6. 多潘立酮不增强神经镇静剂的作用；本品不宜与单胺氧化酶抑制剂（MAOI）同时使用。
7. 由于多潘立酮具有促进胃动力作用，因此理论上会影响合并使用的口服药品的吸收，尤其是缓释或肠衣制剂。
8. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用] 本品直接作用于胃肠壁，可增加胃肠道的蠕动和张力，促进胃排空，增加胃窦和十二指肠运动，协调幽门的收缩，同时也能增强食道的蠕动和食道下端括约肌的张力，抑制恶心、呕吐。本品不易透过血脑屏障。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 富马酸酮替芬鼻喷雾剂说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：富马酸酮替芬鼻喷雾剂

商品名称：

英文名称：

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[作用类别]本品为耳鼻喉科用药类非处方药药品。

[适应症]用于过敏性鼻炎。

[规格]15 毫升：16.7 毫克(以酮替芬计)。每喷含酮替芬 0.15 毫克。每瓶 100 喷。

[用法用量]鼻腔喷雾，一次 1~2 喷 (0.15~0.30 毫克)，一日 1~3 次。

[不良反应]

1. 常见有嗜睡、乏力、口干、鼻腔干燥、恶心。
2. 偶见头痛、头晕、反应迟钝及体重增加。

[禁忌]服用降糖药的糖尿病患者禁用。

[注意事项]

1. 服药期间不得驾驶机动车、车、船、从事高空作业、机械作业、操作精密仪器。从事其他需要高度集中注意力的工作的患者慎用。
2. 对镇静药、催眠药、抗组胺药及乙醇等有增强作用。
3. 孕妇慎用，哺乳期妇女应在医师指导下使用。
4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
5. 本品性状发生改变时禁止使用。
6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]

1. 与多种中枢神经抑制药（如镇静药、催眠药）或酒精、抗组胺药并用，可以增强本品的镇静作用。
2. 不得与口服降血糖药并用。
3. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用]本品兼有组胺 H<sub>1</sub> 受体拮抗作用和抑制过敏反应介质释放作用。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网址：

如有问题可与生产企业联系



## 精氨酸布洛芬片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

### [药品名称]

通用名称：精氨酸布洛芬片

商品名称：

英文名称：

汉语拼音：

### [成份]

### [性状]

[作用类别]本品为解热镇痛药类非处方药药品。

[适应症] 适用于下列症状：牙痛、痛经、因创伤引起的疼痛（例如：运动性损伤）、关节和韧带痛、背痛、头痛，以及流感引起的发热。

[规格] 0.2 克（以布洛芬计）

[用法用量] 口服。成人和 12 岁以上患者，一次 0.2 克（1 片），一日 3~4 次。

### [不良反应]

1. 少数病人可出现恶心、呕吐、胃烧灼感或轻度消化不良、胃肠道溃疡及出血、转氨酶升高、头痛、头晕、耳鸣、视力模糊、精神紧张、嗜睡、下肢水肿或体重骤增等。
2. 罕见皮疹、过敏性肾炎、膀胱炎、肾病综合征、肾乳头坏死或肾功能衰竭、支气管痉挛等。

### [禁忌]

1. 对其他非甾体抗炎药过敏者禁用。
2. 孕妇及哺乳期妇女禁用。
3. 胃或十二指肠溃疡、支气管哮喘、肾脏疾病、血液凝固和血细胞生成障碍患者禁用。

### [注意事项]

1. 本品为对症治疗药，不宜长期或大量使用，用于止痛不得超过 5 天，用于解热不得超过 3 天，如症状不缓解，请咨询医师或药师。
2. 糖尿病患者应在医师指导下使用。
3. 不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品（如某些复方抗感冒药）。
4. 服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。
5. 下列情况患者应在医师指导下使用：有消化性溃疡史、胃肠道出血、心功能不全、高血压、60 岁以上、肝肾功能不全。
6. 如出现胃肠道出血或溃疡、胸痛、气短、无力、言语含糊、疼痛加重、疼痛区域肿胀等情况，应停药并咨询医师。
7. 第一次使用本品如出现皮疹或过敏症状，应停药并咨询医师。
8. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 儿童必须在成人监护下使用。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

### [药物相互作用]

1. 本品与其他解热、镇痛、抗炎药物同用时可增加胃肠道不良反应，并可能导致溃疡。
2. 本品与肝素、双香豆素等抗凝药同用时，可导致凝血酶原时间延长，增加出血倾向。
3. 本品与地高辛、甲氨蝶呤、巴氯酚、口服降血糖药物同用时，能使这些药物的血药浓度增高，

不宜同用。

4. 本品与呋塞米（呋喃苯胺酸）同用时，后者的排钠和降压作用减弱；与抗高血压药同用时，也降低后者的降压效果。
5. 本品与丙磺舒、苯磺唑酮合用时，布洛芬排泄延迟，丙磺舒、苯磺唑酮促进尿酸排泄作用降低。
6. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用] 本品能抑制前列腺素的合成，具有镇痛、解热和抗炎的作用。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 精氨酸布洛芬片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

### [药品名称]

通用名称：精氨酸布洛芬片

商品名称：

英文名称：

汉语拼音：

### [成份]

### [性状]

[作用类别] 本品为解热镇痛药类非处方药药品。

[适应症] 适用于下列症状：牙痛、痛经、因创伤引起的疼痛（例如：运动性损伤）、关节和韧带痛、背痛、头痛、以及流感引起的发热。

[规格] 0.4 克（以布洛芬计）

[用法用量] 口服，成人和 12 岁以上患者，一次 0.4 克（1 片），一日 2 次。

### [不良反应]

1. 少数病人可出现恶心、呕吐、胃烧灼感或轻度消化不良、胃肠道溃疡及出血、转氨酶升高、头痛、头晕、耳鸣、视力模糊、精神紧张、嗜睡、下肢水肿或体重骤增等。
2. 罕见皮疹、过敏性肾炎、膀胱炎、肾病综合征、肾乳头坏死或肾功能衰竭、支气管痉挛等。

### [禁忌]

1. 对其他非甾体抗炎药过敏者禁用。
2. 孕妇及哺乳期妇女禁用。
3. 胃或十二指肠溃疡、支气管哮喘、肾脏疾病、血液凝固和血细胞生成障碍患者禁用。

### [注意事项]

1. 本品为对症治疗药，不宜长期或大量使用，用于止痛不得超过 5 天，用于解热不得超过 3 天，如症状不缓解，请咨询医师或药师。
2. 糖尿病患者应在医师指导下使用。
3. 不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品（如某些复方抗感冒药）。
4. 服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。
5. 下列情况患者应在医师指导下使用：有消化性溃疡史、胃肠道出血、心功能不全、高血压、60 岁以上、肝肾功能不全。
6. 如出现胃肠道出血或溃疡、胸痛、气短、无力、言语含糊、疼痛加重、疼痛区域肿胀等情况，应停药并咨询医师。
7. 第一次使用本品如出现皮疹或过敏症状，应停药并咨询医师。
8. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
10. 本品性状发生改变时禁止使用。
11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
12. 儿童必须在成人监护下使用。
13. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

### [药物相互作用]

1. 本品与其他解热、镇痛、抗炎药物同用时可增加胃肠道不良反应，并可能导致溃疡。
2. 本品与肝素、双香豆素等抗凝药同用时，可导致凝血酶原时间延长，增加出血倾向。
3. 本品与地高辛、甲氨蝶呤、巴氯酚、口服降血糖药物同用时，能使这些药物的血药浓度增高，不宜同用。

4. 本品与呋塞米（呋喃苯胺酸）同用时，后者的排钠和降压作用减弱；与抗高血压药同用时，也降低后者的降压效果。
5. 本品与丙磺舒、苯磺唑酮合用时，布洛芬排泄延迟，丙磺舒、苯磺唑酮促进尿酸排泄作用降低。
6. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用] 本品能抑制前列腺素的合成，具有镇痛、解热和抗炎的作用。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 硫酸氨基葡萄糖片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：硫酸氨基葡萄糖片

商品名称：

英文名称：

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[作用类别] 本品为镇痛类非处方药药品。

[适应症]适用于全身各个部位的骨关节炎，如膝关节、髋关节以及腕、脊柱、手、肩关节和踝关节等。

[规格]0.314 克（相当于硫酸氨基葡萄糖 0.25 克）

[用法用量]口服，最好在进餐后服用，一次 1~2 片，一日 3 次，连续服用 4~12 周，如有必要在医师指导下可延长服药时间。每年重复治疗 2~3 次。

[不良反应]罕见轻度的胃肠不适，如恶心、便秘、腹胀和腹泻；有些病人可能出现过敏反应，包括皮疹、瘙痒和皮肤红斑。偶见轻度嗜睡。

[禁忌]

1. 孕妇和哺乳期妇女禁用。
2. 对硫酸氨基葡萄糖过敏的病人禁用。

[注意事项]

1. 本品宜在饭时或饭后服用，可减少胃肠道不适，特别是有胃溃疡的患者。
2. 严重肝、肾功能不全者慎用。
3. 用药一疗程后，症状未缓解，请咨询医师或药师。
4. 过敏体质者慎用。
5. 本品性状发生改变时禁止使用。
6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]

1. 本品可增加四环素类药物在胃肠道的吸收，减少口服青霉素或氯霉素的吸收。
2. 同时服用非甾体抗炎药的患者可能需降低本品的服用剂量，或降低非甾体抗炎药的服用剂量。
3. 本品与利尿药可能存在相互作用，两药同时服用时可能需增加利尿药的服用剂量。
4. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用]骨关节炎是关节软骨蛋白多糖生物合成异常而呈现退行性变的结果。氨基葡萄糖是一种天然的氨基单糖，是蛋白多糖合成的前体物质，可以刺激软骨细胞产生有正常多聚体结构的蛋白多糖，提高软骨细胞的修复能力，抑制损伤软骨的酶如胶原酶和磷脂酶 A<sub>2</sub>，并可防止损伤细胞的超氧化自由基的产生，可以促进软骨基质的修复和重建，从而可延缓骨关节疼痛的病理过程和疾病的进程，改善关节活动，缓解疼痛。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网址：

如有问题可与生产企业联系

## 氯雷他定颗粒说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：氯雷他定颗粒

商品名称：

英文名称：

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[作用类别]本品为耳鼻喉科及皮肤科用药类非处方药药品。

[适应症]用于治疗季节性过敏性鼻炎（减轻鼻部或非鼻部症状）及特发性荨麻疹。

[规格]5 毫克

[用法用量]口服。成人及 12 岁以上儿童：一日 1 次，一次 2 袋（10 毫克）。

[不良反应]在每天 10 毫克的推荐剂量下，本品未见明显的镇静作用。常见不良反应有乏力、头痛、嗜睡、口干、胃肠道不适包括恶心、胃炎以及皮疹等。罕见不良反应有脱发、过敏反应、肝功能异常、心动过速及心悸等。

[禁忌]禁用于对本品及其所含成份过敏者。

[注意事项]

1. 严重肝功能不全的患者请在医生指导下使用。
2. 妊娠期及哺乳期妇女慎用。
3. 在作皮试前的约 48 小时左右应中止使用本品，因抗组胺药能阻止或降低皮试的阳性反应发生。
4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
5. 本品性状发生改变时禁止使用。
6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]

1. 同时服用酮康唑、大环内酯类抗生素、西咪替丁、茶碱等药物，会提高氯雷他定在血浆中的浓度，应慎用。其他已知能抑制肝脏代谢的药物，在未明确与氯雷他定相互作用前应谨慎合用。
2. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用]本品为高效、作用持久的三环类抗组胺药，为选择性外周 H<sub>1</sub> 受体拮抗剂。可缓解过敏反应引起的各种症状。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网址：

如有问题可与生产企业联系

# 氯雷他定口腔崩解片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：氯雷他定口腔崩解片

商品名称：

英文名称：

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[作用类别] 本品为耳鼻喉科及皮肤科用药类非处方药药品。

[适应症]用于治疗季节性过敏性鼻炎（减轻鼻部或非鼻部症状）及特发性荨麻疹。

[规格]10 毫克

[用法用量]空腹服用。撕开铝箔，取出本品置于舌面，不需用水，无需咀嚼，本品迅速崩解，随唾液吞咽入胃，成人及 12 岁以上儿童：一日 1 次，一次 10 毫克（1 片）。

[不良反应]在每天 10 毫克的推荐剂量下，本品未见明显的镇静作用。常见不良反应有乏力、头痛、嗜睡、口干、胃肠道不适包括恶心、胃炎以及皮疹等。罕见不良反应有脱发、过敏反应、肝功能异常、心动过速及心悸等。

[禁忌]禁用于对本品及其所含成份过敏者。

[注意事项]

1. 严重肝功能不全的患者请在医生指导下使用。
2. 妊娠期及哺乳期妇女慎用。
3. 在作皮试前的约 48 小时左右应中止使用本品，因抗组胺药能阻止或降低皮试的阳性反应发生。
4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
5. 本品性状发生改变时禁止使用。
6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]

1. 同时服用酮康唑、大环内酯类抗生素、西咪替丁、茶碱等药物，会提高氯雷他定在血浆中的浓度，应慎用。其他已知能抑制肝脏代谢的药物，在未明确与氯雷他定相互作用前应谨慎合用。
2. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用] 本品为高效、作用持久的三环类抗组胺药，为选择性外周 H<sub>1</sub> 受体拮抗剂。可缓解过敏反应引起的各种症状。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 乳果糖口服溶液说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：乳果糖口服溶液

商品名称：

英文名称：

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[作用类别] 本品为缓泻药类非处方药药品。

[适应症] 慢性功能性便秘。

[规格]每毫升含乳果糖 667 毫克(15 毫升：10 克)

[用法用量] 口服，成人起始剂量每日 30 毫升，维持剂量每日 10~25 毫升。治疗几天后，可根据患者情况酌减剂量。本品宜在早餐时一次服用。根据乳果糖的作用机制，一至两天可取得临床效果。

[不良反应] 乳果糖不被吸收，剂量过大可引起腹部不适、胃肠胀气、厌食、恶心、呕吐及腹痛、腹泻等。治疗初期容易发生。

[禁忌]

1. 阑尾炎、肠梗阻、不明原因的腹痛、急腹痛及同时使用其他导泻剂者禁用。
2. 本品含有可吸收的糖，糖尿病、半乳糖血症患者禁用。
3. 对乳果糖及其组分过敏者禁用。
4. 对乳糖或半乳糖不耐受者禁用。
5. 尿毒症患者禁用。

[注意事项]

1. 儿童用量请咨询医师。
2. 使用时应注意调整剂量，避免出现剧烈腹泻。
3. 妊娠期头 3 个月慎用。妊娠 3 个月以上及哺乳期妇女应在医师指导下使用。
4. 老人及有其他疾病者应在医师指导下使用。
5. 本品如用于乳果糖缺乏症患者，需注意本品中乳糖的含量。
6. 如果在治疗二三天后，便秘症状无改善或反复出现，请咨询医生。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用] 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用] 乳果糖在结肠中被消化道菌丛转化成有机酸，导致肠道内 pH 值下降，并通过保留水分，增加粪便体积。上述作用刺激结肠蠕动，保持大便通畅，缓解便秘，同时恢复结肠的生理节律。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系



## 乳果糖口服溶液说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：乳果糖口服溶液

商品名称：

英文名称：

汉语拼音：

[成份]

[性状]

[作用类别] 本品为缓泻药类非处方药药品。

[适应症] 慢性功能性便秘。

[规格]每毫升含乳果糖 667 毫克 (200 毫升：133.4 克)

[用法用量] 口服，成人起始剂量每日 30 毫升，维持剂量每日 10~25 毫升。治疗几天后，可根据患者情况酌减剂量。本品宜在早餐时一次服用。根据乳果糖的作用机制，一至两天可取得临床效果。

[不良反应] 乳果糖不被吸收，剂量过大可引起腹部不适、胃肠胀气、厌食、恶心、呕吐及腹痛、腹泻等。治疗初期容易发生。

[禁忌]

1. 阑尾炎、肠梗阻、不明原因的腹痛、急腹痛及同时使用其他导泻剂者禁用。
2. 本品含有可吸收的糖，糖尿病、半乳糖血症患者禁用。
3. 对乳果糖及其组分过敏者禁用。
4. 对乳糖或半乳糖不耐受者禁用。
5. 尿毒症患者禁用。

[注意事项]

1. 儿童用量请咨询医师。
2. 使用时应注意调整剂量，避免出现剧烈腹泻。
3. 妊娠期头 3 个月慎用。妊娠 3 个月以上及哺乳期妇女应在医师指导下使用。
4. 老人及有其他疾病者应在医师指导下使用。
5. 本品如用于乳果糖缺乏症患者，需注意本品中乳糖的含量。
6. 如果在治疗二三天后，便秘症状无改善或反复出现，请咨询医生。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 儿童必须在成人监护下使用。
11. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用] 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用] 乳果糖在结肠中被消化道菌丛转化成有机酸，导致肠道内 pH 值下降，并通过保留水分，增加粪便体积。上述作用刺激结肠蠕动，保持大便通畅，缓解便秘，同时恢复结肠的生理节律。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称：

生产地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

网 址：

如有问题可与生产企业联系

## 碳酸钙二甲硅油咀嚼片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：碳酸钙二甲硅油咀嚼片

商品名称：

英文名称：

汉语拼音：

[成份]本品为复方制剂，每片含碳酸钙 420 毫克与二甲硅油 20 毫克。辅料为：

[性状]

[作用类别]本品为抗酸、消胀类非处方药药品。

[适应症]适用于缓解慢性胃炎引起的烧心、嗝气、反酸、上腹疼痛、饱胀不适等症状。

[规格]

[用法用量]口服。一次 2 片，一日 4 次。饭后 1 小时及睡前半小时各咀嚼服用一次。疗程不超过七天。

[不良反应]

1. 少数人可能有轻度皮疹，嗝气、呕吐或便秘。停药后可自行恢复。
2. 偶可发生奶-碱综合征，表现为高血钙、碱中毒及肾功能不全。（因服用牛奶及碳酸钙、或单用碳酸钙引起）。
3. 过量长期服用可引起胃酸分泌反跳性增高，并可发生高钙血症。

[禁忌] 高钙血症、高钙尿症、洋地黄化患者、含钙肾结石或有肾结石病史患者禁用。

[注意事项]

1. 心肾功能不全者慎用。
2. 儿童、孕妇、哺乳期妇女、老人应在医师指导下使用。
3. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
4. 本品性状发生改变时禁止使用。
5. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
6. 儿童必须在成人监护下使用。
7. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]

1. 本品不宜与洋地黄类药物合用。
2. 本品长期使用可导致便秘，必要时可与其他抗酸药合用或交替使用加以克服。
3. 大量饮用含酒精和咖啡因的饮料以及大量吸烟，均会抑制钙剂的吸收。
4. 大量进食富含纤维素的食物能抑制钙的吸收，因钙与纤维素结合成不易吸收的化合物。
5. 本品与苯妥英钠及四环素类同用，二者吸收减少。
6. 维生素 D、避孕药、雌激素能增加钙的吸收。
7. 含铝的抗酸药与本品同服时，铝的吸收增多。
8. 本品与噻嗪类利尿药合用时，易发生高钙血症（因增加肾小管对钙的重吸收）。
9. 本品与含钾药物合用时，应注意心律失常的发生。
10. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用] 本品中碳酸钙为抗酸药，口服后能中和胃酸，使胃内 pH 值升高，从而减轻胃烧灼感以及反酸等症状，并缓解疼痛；二甲硅油为消泡剂，能改变气泡的表面张力，使其破裂，从而消除胃肠道内的气泡。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称:

生产地址:

邮政编码:

电话号码:

传真号码:

网 址:

如有问题可与生产企业联系

## 维 U 颠茄铝分散片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

[药品名称]

通用名称：维 U 颠茄铝分散片说明书

商品名称：

英文名称：

汉语拼音：

[成份]本品为复方制剂，每片含氢氧化铝 140 毫克，维生素 U<sub>II</sub>（碘甲基蛋氨酸）50 毫克，颠茄浸膏 10 毫克。辅料为：

[性状]

[作用类别] 本品为抗酸及胃黏膜保护类非处方药药品。

[适应症] 用于缓解胃酸过多引起的胃灼热感、胃痛及慢性胃炎。

[规格]

[用法用量] 口服。成人一次 1 片，一日 3 次。

[不良反应]

1. 本品可引起便秘、腹痛、腹泻、恶心、转氨酶升高等常见的消化系统不良反应。
2. 少见眼痛、眼压升高、皮疹，偶见心律失常（心悸）。
3. 肾功能不全患者长期应用可能会有铝蓄积中毒，出现精神症状。
4. 老年人长期应用会导致骨质疏松、视力模糊、小便不畅。

[禁忌]

1. 前列腺肥大、青光眼患者禁用。
2. 阑尾炎或有类似症状者禁用。
3. 骨折及低磷血症患者禁用。

[注意事项]

1. 本品连续使用不得超过 7 天，症状未缓解，请咨询医师或药师。
2. 孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下使用。
3. 高血压、心脏病、胃肠道阻塞性疾患、甲状腺机能亢进、溃疡性结肠炎、反流性食管炎、肾功能不全患者慎用。
4. 低磷血症（如吸收不良综合征）患者不宜长期大量服用。
5. 老年患者慎用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[药物相互作用]

1. 服用本品的同时应避免服用其他药物，因氢氧化铝能与其他药物结合而影响疗效。
2. 本品可减弱甲氧氯普胺、多潘立酮的作用，不宜同服。
3. 本品如需与西咪替丁、雷尼替丁等同用，至少需间隔 1 小时。
4. 本品与肠溶片同服，可使肠溶片加快溶解，不应同用。
5. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

[药理作用] 本品中维生素 U<sub>II</sub> 可促进肉芽发育和黏膜再生；氢氧化铝为抗酸药，能中和过多的胃酸，缓解胃痛及胃烧灼感；颠茄提取物可抑制腺体分泌，解除平滑肌痉挛引起的疼痛。

[贮藏]

[包装]

[有效期]

[执行标准]

[批准文号]

[说明书修订日期]

[生产企业]

企业名称:

生产地址:

邮政编码:

电话号码:

传真号码:

网 址:

如有问题可与生产企业联系