

附件 1

古代经典名方关键信息表（25 首方剂）（征求意见稿）

（一）桃核承气汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 （汉·张仲景）	桃仁五十个（去皮尖），大黄四两，桂枝二两（去皮），甘草二两（炙），芒硝二两。 上五味，以水七升，煮取二升半，去滓，内芒硝，更上火，微沸下火，先食温服五合，日三服。	桃仁	蔷薇科植物山桃 <i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch. 的干燥成熟种子	燀桃仁	13.50g	上五味，加水 1400ml，煮取 500ml，去药渣后加入芒硝，再加热至沸腾。饭前温服 100ml，日 3 次。	【功效】逐瘀泻热。 【主治】下焦蓄血证。症见少腹急结，小便自利，甚则烦躁谵语，神志如狂，至夜发热，以及血瘀经闭，痛经，脉沉实而涩者。
		大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根及根茎	生品	55.20g		
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	27.60g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	27.60g		
		芒硝	硫酸盐类矿物芒硝族芒硝，经加工精制而成的结晶体。主含含水硫酸钠 ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)	生品	27.60g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取二升半”“温服五合”，可知本方每服量为煎出总量的 1/5。故本方每次的服药量为：桃仁 2.70g，大黄 11.04g，桂枝 5.52g，甘草 5.52g，芒硝 5.52g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(二) 芍药甘草汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》（汉·张仲景）	白芍药、甘草各四两（炙）。 上二味，以水三升，煮取一升五合，去滓，分温再服。	白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	55.20g	上二味，以水600ml，煮取300ml，温服，日2次。	【功效】益阴养血，缓急止痛。 【主治】阴血不足，筋脉失养所致挛急疼痛诸证，症见腿脚挛急，腹中疼痛。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	55.20g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取一升五合”“分温再服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/2。故本方每次的服药量为：白芍 27.60g，甘草 27.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-2 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(三) 半夏泻心汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉·张仲景)	半夏半升(洗),黄芩、干姜、人参、甘草(炙)各三两,黄连一两,大枣十二枚(擘)。 上七味,以水一斗,煮取六升,去滓,再煎取三升,温服一升,日三服。	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	34.50g	上七味,以水2000ml,煮取1200ml,去药渣,再浓缩至600ml,温服200ml,日3次。	【功效】寒热平调,散结除痞。 【主治】寒热互结之痞证。症见心下痞,但满而不痛,或呕吐,肠鸣下利,舌苔腻而微黄。
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	41.40g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	生品	41.40g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	41.40g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	41.40g		
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎	生品	13.80g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	36.00g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煎取三升,温服一升”,可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为:半夏 11.50g,黄芩 13.80g,干姜 13.80g,人参 13.80g,甘草 13.80g,黄连 4.60g,大枣 12.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点,日服用次数建议 1-3 次,根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算,若与当今主流用量严重不符,在固定原方比例和每服量的基础上,结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(四) 真武汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》（汉·张仲景）	茯苓、芍药、生姜（切）各三两，白术二两，附子一枚（炮，去皮，破八片）。 上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服。	茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	41.40g	上五味，以水1600ml，煮取600ml，去药渣，每次温服140ml，日3次。	【功能】温阳利水。 【主治】阳虚水泛证。症见小便不利，畏寒肢冷，头目眩晕，心下悸动不宁，身体筋肉瞤动，四肢沉重疼痛，浮肿，腰以下为甚；或腹痛泄泻；或呕逆咳喘。舌质淡胖，边有齿痕，舌苔白滑，脉沉细。
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	41.40g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	41.40g		
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	生品	27.60g		
		附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的加工品	黑顺片	15.00g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升”“温服七合”，可知本方每服量为煎出总量的7/30。故本方每次的服药量为：茯苓9.66g，白芍9.66g，生姜9.66g，白术6.44g，附子3.50g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议1-3次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

（五）黄芪桂枝五物汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》 (汉·张仲景)	黄芪三两，芍药三两， 桂枝三两，生姜六两， 大枣十二枚。 上五味，以水六升， 煮取二升，温服七合， 日三服。	黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根	生品	41.40g	上五味，以水 1200ml，煮取 400ml，温服 140ml，日 3 次。	【功效】益气温经，和血通痹。 【主治】血痹证。症见肌肤麻木不仁，微恶风寒，舌淡苔白，脉微涩而紧。
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	41.40g		
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	41.40g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	82.80g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	36.00g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取二升，温服七合”，可知本方每服量为煎出总量的 7/20。故本方每次的服药量为：黄芪 14.49g，白芍 14.49g，桂枝 14.49g，生姜 28.98g，大枣 12.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(六) 瓜蒌薤白半夏汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》 (汉·张仲景)	瓜蒌实一枚，薤白三两，半夏半斤，白酒一斗。 上四味，同煮，取四升，温服一升，日三服。	瓜蒌	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 的干燥成熟果实	生品	60.00g	加入黄酒2000ml，煎至800ml，温服200ml，日3次。	【功效】通阳散结，祛痰宽胸。 【主治】胸痹痰浊壅塞证。症见胸痛彻背，不能安卧，喘息咳唾，短气者。
		薤白	百合科植物小根蒜 <i>Allium macrostemon</i> Bge. 的干燥鳞茎	生品	41.40g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	34.50g		
		黄酒	参考国家标准 GB/T 13662-2018 传统型黄酒（以糯米 <i>Oryza sativa</i> var. <i>glutinosa</i> 为原料）		2000ml		
备注	<p>据原方中煎煮法“取四升，温服一升”，可知本方每服量为煎出总量的 1/4。故本方每次的服药量为：瓜蒌 15.00g，薤白 10.35g，半夏 8.63g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(七) 大建中汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》 (汉·张仲景)	蜀椒二合(去汗), 干姜四两,人参二两。 上三味,以水四升, 煮取二升,去滓,内 胶饴一升,微火煮取 一升半,分温再服; 如一炊顷,可饮粥二 升,后更服。当一日 食糜,温覆之。	花椒	芸香科植物花椒 <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim. 的干燥成熟果皮	炒花椒	9.00g	上三味药, 以水 800ml,煮取 400ml,去药 渣,加入饴 糖 200ml, 小火煮取 300ml,每次 温服 150ml,日2 次。	【功效】温中补 虚,降逆止痛。 【主治】中阳衰 弱,阴寒内盛证。 症见心胸中大寒 痛,呕不能食, 腹中寒,甚则可 上冲皮起如有 形,腹痛拒按, 痛无定处,或腹 中漉漉有声,手 足厥冷,舌质淡, 苔白滑,脉细紧, 或脉沉伏而迟。
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	生品	55.20g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	27.60g		
		胶饴	参考国家标准 GB/T20883-2017 麦芽糖(糯米 <i>Oryza sativa</i> var. <i>glutinosa</i> 、大麦 <i>Hordeum vulgare</i> L. 为原料)		200ml		
备注	<p>据原方中煎煮法“微火煮取一升半,分温再服”,可知本方煎出总量为2次服量。故本方每次的服药量为:花椒 4.50g,干姜 27.60g,人参 13.80g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点,日服用次数建议 1-2 次,根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算,若与当今主流用量严重不符,在固定原方比例和每服量的基础上,结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(八) 麦门冬汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉·张仲景）	麦门冬七升，半夏一升，人参二两，甘草二两，粳米三合，大枣十二枚。上六味，以水一斗二升，煮取六升，温服一升，日三夜一服。	麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f) Ker-Gawl. 的干燥块根	生品	212.00g	上六味药，以水2400ml，煮取1200ml，每次温服200ml，日3夜1次。	【功效】滋养肺胃，降逆下气。 【主治】虚热肺痿或胃阴不足证。症见咳唾涎沫，短气喘促，或呃逆呕吐，咽干口燥，舌干红少苔，脉虚数。
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	69.00g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	27.60g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	27.60g		
		粳米	禾本科植物粳稻 <i>Oryza sativa</i> L. subsp. <i>japonica</i> Kato 的干燥成熟种仁	生品	52.80g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	36.00g		
备注	<p>麦冬门汤在《古代经典名方目录(第一批)》的处方出处中，麦冬为七升，麦冬一升约为106g，远超常规用量。考证多个版本的《金匱要略》以及记载仲景方剂的《外台秘要》、《千金方》等书，麦门冬汤中的麦冬剂量均有所不同。《外台秘要》所载麦门冬汤中麦冬为二升，更接近临床常用量，领域专家亦推荐本方中麦冬应取二升为宜。故建议本方中麦冬按二升进行折算，折合约212g。</p> <p>据原方中煎服法“煮取六升，温服一升”，可知本方每服剂量为煎出总量的1/6，故本方每次的服药量为：麦冬35.33g，半夏11.50g，人参4.60g，甘草4.60g，粳米8.80g，大枣6.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议1-4次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

（九）温胆汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《备急千金要方》（唐·孙思邈）	半夏、竹茹、枳实各二两，橘皮三两，生姜四两，甘草一两。右六味，咬咀，以水八升，煮取二升，分三服。	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	27.60g	上六味药粉碎成粗粒，以水1600ml，煮取400ml，分3次服用。	【功效】理气化痰，和胃利胆。 【主治】胆胃不和，痰热内扰证。症见胆怯易惊，虚烦不眠，惊悸多梦；或呕恶，呃逆，口苦，眩晕。苔白腻，脉弦滑。
		竹茹	禾本科植物淡竹 <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf ex Rendle 的茎秆的干燥中间层	生品	27.60g		
		枳实	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种的干燥幼果	麸炒枳实	27.60g		
		陈皮	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮	生品	41.40g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	55.20g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	13.80g		
备注	<p>唐代方药计量传承了汉代的度量衡制度，服法亦参考汉代方剂处理。据原方中煎服法“煮取二升，分三服”，可知本方每服剂量为煎出总量的1/3，故本方每次的服药量为：半夏9.20g，竹茹9.20g，枳实9.20g，陈皮13.80g，生姜18.40g，甘草4.60g。日服用次数建议1-3次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(十) 小续命汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《备急千金要方》（唐·孙思邈）	麻黄、防己、人参、黄芩、桂心、甘草、芍药、川芎、杏仁各一两，附子一枚，防风一两半，生姜五两。 右十二味，㕮咀，以水一斗二升，先煮麻黄三沸，去沫，内诸药，煮取三升。分三服，甚良。不瘥，更合三、四剂，必佳。	麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 的干燥草质茎	生品	13.80g	上十二味药粉碎成粗粒，以水2400ml，先煮麻黄，去上沫，加入其他药物，煮取600ml，分3次服用。	【功效】祛风散寒，益气温阳。 【主治】阳气不足，风中经络证。症见口眼歪斜，语言不利，筋脉拘急，半身不遂，或神志闷乱等。亦治风湿痹痛。
		防己	防己科植物粉防己 <i>Stephania tetrandra</i> S. Moore 的干燥根	生品	13.80g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	13.80g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	13.80g		
		肉桂	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮	生品	13.80g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	13.80g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	13.80g		
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort. 的干燥根茎	生品	13.80g		
		苦杏仁	蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子	燀苦杏仁	13.80g		
附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 子根的加工品	黑顺片	15.00g				

		防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk. 的干燥根	生品	20.70g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	69.00g		
备注	<p>唐代方药计量传承了汉代的度量衡制度，服法亦参考汉代方剂处理。据原方中煎服法“煮取三升，分三服”，可知本方每服剂量为煎出总量的 1/3，故本方每次的服药量为：麻黄 4.60g，防己 4.60g，人参 4.60g，黄芩 4.60g，肉桂 4.60g，甘草 4.60g，白芍 4.60g，川芎 4.60g，杏仁 4.60g，附子 5.00g，防风 6.90g，生姜 23.00g。日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(十一) 开心散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《备急千金要方》（唐·孙思邈）	远志、人参各四分，茯苓二两，菖蒲一两。 右四味治下筛，饮服方寸匕，日三。	远志	远志科植物远志 <i>Polygala tenuifolia</i> Willd. 或卵叶远志 <i>Polygala sibirica</i> L. 的干燥根	生品	13.80g	上四味药粉碎成细粉，每次冲服5g，日3次。	【功效】益气养心，安神定志。 【主治】心气不足证，症见神志不宁，健忘失眠，心悸怔忡等。
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	13.80g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	27.60g		
		石菖蒲	天南星科植物石菖蒲 <i>Acorus tatarinowii</i> Schott 的干燥根茎	生品	13.80g		
备注							

(十二) 当归饮子

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《严氏济生方》（宋·严用和）	当归（去芦）、白芍药、川芎、生地黄（洗）、白蒺藜（炒，去尖）、防风（去芦）、荆芥穗各一两，何首乌、黄芪（去芦），甘草（炙）各半两。右咬咀，每服四钱，水一盏半，姜五片，煎至八分，去滓温服。不拘时候。	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	41.30g	上药粉碎为粗粒，每服16.52g，加水450ml，加入生姜5g，煮取240ml，去滓温服。	【功效】养血润燥，祛风止痒。 【主治】心血凝滞，内蕴风热证，症见皮肤疮疥，或肿或痒，或脓水浸淫，或发瘾疹；或皮肤瘙痒，入夜尤甚，舌淡红，苔薄，脉细弦。
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	41.30g		
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort. 的干燥根茎	生品	41.30g		
		地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的新鲜或干燥块根	生品	41.30g		
		蒺藜	蒺藜科植物蒺藜 <i>Tribulus terrestris</i> L. 的干燥成熟果实	炒蒺藜	41.30g		
		防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk. 的干燥根	生品	41.30g		
		荆芥穗	唇形科植物荆芥 <i>Schizonepeta tenuifolia</i> Briq. 的干燥花穗	生品	41.30g		
		何首乌	蓼科植物何首乌 <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. 的干燥块根	生品	20.65g		
黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.)	生品	20.65g				

			Bge. 的干燥根				
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	20.65g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品			
备注	<p>本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量为 49.56g，各药的日服量折算如下：当归 5.84g，白芍 5.84g，川芎 5.84g，生地黄 5.84g，蒺藜 5.84g，防风 5.84g，荆芥穗 5.84g，何首乌 2.92g，黄芪 2.92g，甘草 2.92g。另加生姜 15g。</p>						

(十三) 泻白散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《小儿药证直诀》（宋·钱乙）	地骨皮（洗去土，焙）、桑白皮（细锉炒黄）各一两，甘草（炙）一钱。上锉散，入粳米一撮，水二小盏，煎七分，食前服。	地骨皮	茄科植物枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill. 的干燥根皮	地骨皮（焙）	41.30g	上药粉碎成粗粒，每次取 6.2g，加粳米 2g，以水 300ml，煎取 180ml，饭后温服	【功效】清泻肺热，止咳平喘。 【主治】小儿肺热咳喘证。症见气喘咳嗽，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数。
		桑白皮	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥根皮	炒桑白皮	41.30g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	20.65g		
		粳米	禾本科植物粳稻 <i>Oryza sativa</i> L. subsp. <i>japonica</i> Kato. 的干燥成熟种仁	生品			
备注	<p>1. 泻白散在《古代经典名方目录(第一批)》中的出处《小儿药证直诀》其版本中甘草与地骨皮、桑白皮剂量差距很大，且服法中无每服量，无法确定实际使用剂量。根据《小儿药证直诀》“四库纂修武英殿本”版本记载“桑白皮细锉，炒黄。地骨皮洗去土，焙，各一两。甘草炒，半两。右件为细末，每服一二钱，水一中盏，入粳米百粒，同煎至六分，食后温服”确定以上剂量和煎服法。每服量取“一二钱”的中间值，即 6.20g。</p> <p>本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 18.60g，各药的日服量折算如下：桑白皮 7.44g，地骨皮 7.44g，甘草 3.72g。另加粳米 6.00g。</p> <p>2. 本方中地骨皮除杂处理后注明焙的操作，其目的为使药材质地酥脆，便于后续粉碎，因此建议尊重原方炮制方法，可参考地方标准如《安徽省中药炮制规范（2005年版）》中的焙法。</p>						

(十四) 清心莲子饮

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《太平惠民和剂局方》 (宋·太平惠民和剂局)	黄芩、麦门冬(去心)、地骨皮、车前子、甘草(炙)各半两,石莲肉(去心)、白茯苓、黄芪(蜜炙)、人参各七钱半。 右剉散。每三钱,麦门冬十粒,水一盞半,煎取八分,去滓,水中沉冷,空心,食前服。	黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	20.65g	上药粉碎成粗粒,每服12.39g,麦冬3g,加水450ml,煎取240ml,去药渣,饭前冷服。	【功效】益气养阴,清心泻火,止淋化浊。 【主治】心火偏旺,气阴两虚,湿热下注证。症见遗精淋浊,血崩带下,遇劳则发,或腰膝酸软,或消渴,失眠多梦,口干舌燥,烦躁发热,倦怠乏力。
		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f) Ker-Gawl. 的干燥块根	生品(去心)	20.65g		
		地骨皮	茄科植物枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill. 的干燥根皮	生品	20.65g		
		车前子	车前科植物车前 <i>Plantago asiatica</i> L. 的干燥成熟种子	生品	20.65g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	20.65g		
		莲子	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥成熟种子	生品(去心)	30.98g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	30.98g		
		黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根	蜜炙黄芪	30.98g		

		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	30.98g	
备注	<p>1. 麦冬传统去心，为历代所沿用，延续至今，如《中华人民共和国药典》（1963年版）麦冬炮制项内明确“润透后抽去心”，自1977年版《中华人民共和国药典》起不再要求去心，但注明“轧扁”并延续至2010年版，自2015年版起“轧扁”成为其中一种规格。可见去心为历代主流炮制加工，鉴于本方中注明“去心”，可参考《中华人民共和国药典》（1963年版）执行。</p> <p>2. 本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为37.17g，各药的日服量折算如下：黄芩3.38g，麦冬3.38g，地骨皮3.38g，车前子3.38g，甘草3.38g，莲子5.07g，茯苓5.07g，黄芪5.07g，人参5.07g。另加麦冬9.00g。</p>					

(十五) 羌活胜湿汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《内外伤辨惑论》(金·李东垣)	羌活、独活各一钱，藁本、防风、甘草(炙)、川芎各五分，蔓荆子三分。上咬咀，都作一服，水二盏，煎至一盏，去渣，大温服，空心食前。	羌活	伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根	生品	4.13g	上药粉碎为粗粒，加水600ml，煎至300ml，去药渣，饭前温服。	【功效】祛风，胜湿，止痛。 【主治】风湿在表之痹证。症见肩背痛不可回顾，头痛身重，或腰脊疼痛，难以转侧，苔白，脉浮。
		独活	伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根	生品	4.13g		
		藁本	伞形科植物藁本 <i>Ligusticum sinense</i> Oliv. 或辽藁本 <i>Ligusticum jeholense</i> Nakai et Kitag. 的干燥根茎和根	生品	2.06g		
		防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk. 的干燥根	生品	2.06g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	2.06g		
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort. 的干燥根茎	生品	2.06g		
		蔓荆子	马鞭草科植物单叶蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. var. <i>simplicifolia</i> Cham. 或蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. 的干燥成熟果实	生品	1.24g		
备注	本方各药直接折算剂量总和 17.74g 为一次用量，按日服三次计算，则本方的日服总量为 53.22g，各药的日服量折算如下：羌活 12.39g，独活 12.39g，藁本 6.18g，防风 6.18g，甘草 6.18g，川芎 6.18g，蔓荆子 3.72g。						

(十六) 当归补血汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《内外伤辨惑论》（金·李东垣）	黄芪一两，当归二钱（酒洗）。 上件咀，都作一服。水二盏，煎至一盏，去渣，温服，空心食前。	黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根	生品	41.30g	上药粉碎为粗粒，加水600ml，煎至300ml，去药渣，饭前温服。	【功效】补气生血。 【主治】血虚发热证。症见肌热，燥热，烦渴引饮，目赤面红，昼夜不息，脉洪大而虚，重按无力。
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	酒当归	8.26g		
备注	本方各药直接折算剂量总和 49.56g 为一次用量，按日服三次计算，则本方的日服总量为 148.68g，各药的日服量折算如下：黄芪 123.90g，当归 24.78g。						

(十七) 地黄饮子

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《黄帝素问宣明论方》（金·刘完素）	熟干地黄、巴戟（去心）、山茱萸、石斛、肉苁蓉（酒浸，焙）、附子（炮）、五味子、官桂、白茯苓、麦门冬（去心）、菖蒲、远志（去心）各等分。右为末，每服三钱，水一盏半，生姜五片，枣一枚，薄荷，同煎至八分，不计时候。	熟地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的干燥块根的炮制加工品	熟地黄（蒸法）	1.03g	上药粉碎为粗粒，每次服12.39g，加水450ml，生姜5g，枣3g，薄荷1g，煎煮至240ml。	【功效】滋肾阴，补肾阳，开窍化痰。 【主治】暗痲证。症见舌强不能言，足废不能用，口干不欲饮，足冷面赤，脉沉细弱。
		巴戟天	茜草科植物巴戟天 <i>Morinda officinalis</i> How 的干燥根	生品	1.03g		
		山茱萸	山茱萸科植物山茱萸 <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果肉	生品	1.03g		
		石斛	兰科植物铁皮石斛 <i>Dendrobium officinale</i> Kimura et Migo 或霍山石斛 <i>Dendrobium huoshanense</i> C. Z. Tang et S. J. Cheng 的干燥茎	生品	1.03g		
		肉苁蓉	列当科植物肉苁蓉 <i>Cistanche deserticola</i> Y. C. Ma 的干燥带鳞叶的肉质茎	酒苁蓉	1.03g		
		附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的加工品	黑顺片	1.03g		
		五味子	木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实	生品	1.03g		
		肉桂	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮	生品	1.03g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	1.03g		

		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f) Ker-Gawl. 的干燥块根	生品(去心)	1.03g		
		石菖蒲	天南星科植物石菖蒲 <i>Acorus tatarinowii</i> Schott 的干燥根茎	生品	1.03g		
		远志	远志科植物远志 <i>Polygala tenuifolia</i> Willd. 或卵叶远志 <i>Polygala sibirica</i> L. 的干燥根	生品	1.03g		
		薄荷	唇形科植物薄荷 <i>Mentha haplocalyx</i> Briq. 的干燥地上部分	生品	1.00g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	5.00g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	3.00g		
备注	<p>1. 《中华人民共和国药典》(2020年版)巴戟天、远志饮片炮制已做去心要求,因此按现行标准不再单独加注;麦冬传统去心,为历代所沿用,延续至今,如《中华人民共和国药典》(1963年版)麦冬炮制项内明确“润透后抽去心”,自1977年版《中华人民共和国药典》起不再要求去心,但注明“轧扁”并延续至2010年版,自2015年版起“轧扁”成为其中一种规格。可见去心为历代主流炮制加工,鉴于本方中注明“去心”,可参考《中华人民共和国药典》(1963年版)执行。</p> <p>2. 本方直接折算剂量并非每日服量,结合方剂组成及每服量,按日服三次计算,则本方的日服总量约为37.17g,各药的日服量折算如下:熟地黄3.10g,巴戟天3.10g,山茱萸3.10g,石斛3.10g,肉苁蓉3.10g,附子3.10g,五味子3.10g,肉桂3.10g,茯苓3.10g,麦冬3.10g,石菖蒲3.10g,远志3.10g。另加薄荷3.00g,生姜15.00g,大枣9.00g。</p>						

(十八) 清金化痰汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医学统旨》(明·叶文龄)	黄芩、山栀各一钱半, 桔梗二钱, 麦门冬(去心)、桑皮、贝母、知母、瓜蒌仁(炒)、橘红、茯苓各一钱, 甘草四分。水二盅, 煎八分, 食后服。	黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	5.60g	上药加水400ml, 煎至160ml, 饭后服用。	【功效】清热润肺, 化痰止咳。 【主治】痰热郁肺证。症见咳嗽气息粗促, 或喉中有痰声, 痰多、质粘厚或稠黄, 咯吐不爽, 咽喉干痛, 或有热腥味, 或吐血痰, 胸胁胀满, 咳时引痛, 面赤, 鼻出热气, 或有身热, 口干欲饮, 舌苔薄黄腻, 质红, 脉
		栀子	茜草科植物栀子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实	生品	5.60g		
		桔梗	桔梗科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC. 的干燥根	生品	7.46g		
		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl. 的干燥块根	生品(去心)	3.73g		
		桑白皮	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥根皮	生品	3.73g		
		浙贝母	百合科植物浙贝母 <i>Fritillaria thunbergii</i> Miq. 的干燥鳞茎	生品	3.73g		
		知母	百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge. 的干燥根茎	生品	3.73g		
		瓜蒌子	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 的干燥成熟种子	炒瓜蒌子	3.73g		
		橘红	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥外层果皮	生品	3.73g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	3.73g		

		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	1.49g	滑数。
备注	<p>1. 麦冬传统去心，为历代所沿用，延续至今，如《中华人民共和国药典》（1963年版）麦冬炮制项内明确“润透后抽去心”，自1977年版《中华人民共和国药典》起不再要求去心，但注明“轧扁”并延续至2010年版，自2015年版起“轧扁”成为其中一种规格。可见去心为历代主流炮制加工，鉴于本方中注明“去心”，可参考《中华人民共和国药典》（1963年版）执行。</p> <p>2. 本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日1-3剂遵医嘱使用。</p>					

(十九) 金水六君煎

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《景岳全书》（明·张景岳）	当归二钱，熟地三、五钱，陈皮一钱半，半夏二钱，茯苓二钱，炙甘草一钱。水二盅，生姜三、五、七片，煎七、八分，食远温服。	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	7.46g	上药加水400ml，生姜5g，煎至150ml，温服。	【功效】滋养肺肾，祛湿化痰。 【主治】肺肾阴虚，湿痰内盛证。症见咳嗽呕恶，喘急多痰，痰带咸味，或咽干口燥，自觉口咸，舌质红，苔白滑或薄腻。
		熟地黄	玄参科植物生地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的干燥块根的炮制加工品	熟地黄（蒸制法）	14.92g		
		陈皮	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮	生品	5.60g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	7.46g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	7.46g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎的炮制加工品	炒甘草	3.73g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	5.00g		
备注	剂量为区间者，取中间值。方中熟地取四钱，生姜取五片。本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日 1-3 剂遵医嘱使用。						

(二十) 济川煎

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《景岳全书》 (明·张景岳)	当归三、五钱，牛膝二钱，肉苁蓉(酒洗去咸)二、三钱，泽泻一钱半，升麻五分、七分或一钱，枳壳一钱。水一盅半，煎七八分，食前服。	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	14.92g	上药，以水300ml煎煮，煎至约150ml。饭前服。	【功效】温肾益精，润肠通便。 【主治】肾虚便秘证。症见大便秘结，小便清长，腰膝酸软，头目眩晕，舌淡苔白，脉沉迟。
		牛膝	苋科植物牛膝 <i>Achyranthes bidentata</i> Bl. 的干燥根	生品	7.46g		
		肉苁蓉	列当科植物肉苁蓉 <i>Cistanche deserticola</i> Y. C. Ma 的干燥带鳞叶的肉质茎	酒苁蓉	9.33g		
		泽泻	泽泻科植物东方泽泻 <i>Alisma orientale</i> (Sam.) Juzep. 或泽泻 <i>Alisma plantago-aquatica</i> Linn. 的干燥块茎	生品	5.60g		
		升麻	毛茛科植物升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L. 的干燥根茎	生品	2.61g		
		枳壳	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种的干燥未成熟果实	生品	3.73g		
备注	剂量为区间者，取其中间值。方中当归取四钱，肉苁蓉取二钱半，升麻取七分。本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日 1-3 剂遵医嘱使用。						

(二十一) 清肺汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《万病回春》（明·龚廷贤）	黄芩（去朽心）一钱半，桔梗（去芦）、茯苓（去皮）、陈皮（去白）、贝母（去心）、桑白皮各一钱，当归、天门冬（去心）、山梔、杏仁（去皮尖）、麦门冬（去心）各七分，五味子七粒，甘草三分。上锉，生姜、枣子煎，食后服。	黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品（枯芩）	5.60g	水煎服	【功效】清热润肺，降气化痰。 【主治】痰热咳嗽。症见咳嗽，气喘息粗，喉中痰鸣，咯痰黄稠量多，或久嗽声哑，舌红苔黄腻，脉滑数。
		桔梗	桔梗科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC. 的干燥根	生品	3.73g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	3.73g		
		橘红	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥外层果皮	生品	3.73g		
		浙贝母	百合科植物浙贝母 <i>Fritillaria thunbergii</i> Miq. 的干燥鳞茎	浙贝片	3.73g		
		桑白皮	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥根皮	生品	3.73g		
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	2.61g		
		天冬	百合科植物天冬 <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. 的干燥块根	生品（去心）	2.61g		
		梔子	茜草科植物梔子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实	生品	2.61g		
		苦杏仁	蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子	燀苦杏仁	2.61g		
麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i>	生品（去心）	2.61g				

			(L. f) Ker-Gawl. 的干燥块根				
		五味子	木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实	生品	1.00g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	1.12g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	2.00g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	6.00g		
备注	<p>1. 麦冬传统去心，为历代所沿用，延续至今，如《中华人民共和国药典》（1963年版）麦冬炮制项内明确“润透后抽去心”，自1977年版《中华人民共和国药典》起不再要求去心，但注明“轧扁”并延续至2010年版，自2015年版起“轧扁”成为其中一种规格。可见去心为历代主流炮制加工，鉴于本方中注明“去心”，可参考《中华人民共和国药典》（1963年版）执行。</p> <p>天冬历代本草多要求去心，鉴于本方注明“去心”处理，从尊重原方出发，建议去心加工。</p> <p>浙贝母现行《中华人民共和国药典》（2020年版）产地加工项内“浙贝片”明确“除去芯芽”，因此建议使用此规格。</p> <p>2. 本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日1-3剂遵医嘱使用。</p>						

(二十二) 保元汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《简明医彙》（明·孙志宏）	人参一钱，黄芪二钱，甘草五分，肉桂二分。 右加生姜一片，水煎服。	人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	3.73g	水煎服	【功效】补气温阳。 【主治】元气不足证。症见倦怠乏力，面色㿔白，少气畏寒，不欲饮食。
		黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根	生品	7.46g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	1.87g		
		肉桂	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮	生品	0.75g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	1.00g		
备注	本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日 1-3 剂遵医嘱使用。						

(二十三) 半夏白术天麻汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医学心悟》 (清·程国彭)	半夏一钱五分，天麻、茯苓、橘红各一钱，白术三钱，甘草五分。 生姜一片，大枣二枚，水煎服。	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	5.60g	水煎服	【功效】化痰熄风，健脾祛湿。 【主治】风痰上扰证。症见眩晕，头痛，胸膈痞闷，恶心呕吐，舌苔白膩，脉弦滑。
		天麻	兰科植物天麻 <i>Gastrodia elata</i> Bl. 的干燥块茎	生品	3.73g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	3.73g		
		橘红	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥外层果皮	生品	3.73g		
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	生品	11.19g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	1.87g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	鲜品	1.00g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	6.00g		
备注	本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日 1-3 剂遵医嘱使用。						

(二十四) 易黄汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《傅青主女科》(清·傅山)	山药一两(炒), 芡实一两(炒), 黄柏二钱(盐水炒), 车前子一钱(酒炒), 白果十枚(碎)。水煎服。	山药	薯蓣科植物薯蓣 <i>Dioscorea opposita</i> Thunb. 的干燥根茎	清炒山药	37.30g	水煎服	【功效】固肾止带, 清热祛湿。 【主治】肾虚湿热带下证。症见带下黏稠量多, 色黄如浓茶汁, 其气腥秽, 舌红, 苔黄腻。
		芡实	睡莲科植物芡 <i>Euryale ferox</i> Salisb. 的干燥成熟种仁	清炒芡实	37.30g		
		黄柏	芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid. 的干燥树皮	盐黄柏	7.46g		
		车前子	车前科植物车前 <i>Plantago asiatica</i> L. 的干燥成熟种子	酒车前子	3.73g		
		白果	银杏科植物银杏 <i>Ginkgo biloba</i> L. 的干燥成熟种子	生品	10.00g		
备注	山药、芡实参考《中华人民共和国药典》(2020年版)炮制通则清炒法, 车前子参考酒炙法。						

(二十五) 宣郁通经汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《傅青主女科》(清·傅山)	白芍五钱(酒炒), 当归五钱(酒洗), 丹皮五钱, 山栀子三钱(炒), 白芥子二钱(炒研), 柴胡一钱, 香附一钱(酒炒), 川郁金一钱(醋炒), 黄芩一钱(酒炒), 生甘草一钱。水煎服。	白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	酒白芍	18.65g	水煎服	【功效】疏肝泻火, 理气养血。 【主治】肝郁化火之经前腹痛证。症见经前腹痛, 少腹尤甚, 经来多紫黑瘀块者。
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	酒当归	18.65g		
		牡丹皮	毛茛科植物牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr. 的干燥根皮	生品	18.65g		
		栀子	茜草科植物栀子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实	炒栀子	11.19g		
		白芥子	十字花科植物白芥 <i>Sinapis alba</i> L. 的干燥成熟种子	炒芥子	7.46g		
		柴胡	伞形科植物狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd. 或柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC. 的干燥根	生品	3.73g		
		香附	莎草科植物莎草 <i>Cyperus rotundus</i> L. 的干燥根茎	酒香附	3.73g		
		姜黄	姜科植物姜黄 <i>Curcuma longa</i> L. 的干燥根茎	醋姜黄	3.73g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	酒黄芩	3.73g		
甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i>	生品	3.73g				

		Fisch. 的干燥根和根茎			
备注	<p>历代郁金的来源根据所记载的产地、花期、花序着生方式、根部形态特征、颜色以及历代所绘药图等可以明确为今姜科植物 <i>Curcuma longa</i> L. 的干燥根茎，本属其他多种植物的根茎则根据不同的加工方式分为莪术、姜黄和片姜黄，互有演变，但药用部位均为根茎，未见块根；自清代中后期以来受产量、交通等因素影响，逐步将本属多种植物的卵形或纺锤形块根作为郁金使用，而 <i>Curcuma longa</i> L. 的干燥根茎则逐步称为“姜黄”。本属多种植物的根茎因疗效明确，自唐代以来纳入本草沿用至今，而块根与根茎成分差异极大，有鉴于此，建议本方川郁金以姜科植物 <i>Curcuma longa</i> L. 的干燥根茎为来源，然因目前《中华人民共和国药典》已将该来源定为姜黄，并将本属多种植物的块根定为郁金来源，为避免名称混乱，因此将药味名称表述为姜黄，原方标注醋炒，可参考《中华人民共和国药典》炮制通则中醋炙法。</p>				