

新泰恬®

注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(II)



深圳华润九新药业有限公司
(华润三九旗下企业)



10:1 杀菌更高效
中重度感染最优选
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(II)

01

基本信息
基本信息
基本信息

02

安全性
安全性
安全性

03

有效性
有效性
有效性

04

创新性
创新性
创新性

05

公平性
公平性
公平性



新泰恬

1.1 基本信息：唯一治疗中重度感染的阿莫西林/克拉维酸注射剂

用于治疗儿童中重度感染，降低克拉维酸使用量，减少不良反应

华润三九
CR SANJIU

10:1

基础信息

通用名称：注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(II)

商品名称：新泰恬®

注册规格：1.1g($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ 1.0g与 $C_8H_9NO_5$ 0.1g)
2.2g($C_{16}H_{19}N_3O_5S$ 2.0g与 $C_8H_9NO_5$ 0.2g)

是否OTC：否

上市情况

全球首个上市国家：中国

中国大陆首次上市时间：2023年11月

上市许可持有人：深圳华润九新药业有限公司

适应症

适用于以下由敏感病原体所致的**中度至重度**感染的短期治疗：

- 1、上呼吸道感染：如反复发作的扁桃体炎、鼻窦炎、中耳炎；
- 2、下呼吸道感染：如慢性支气管炎急性发作、细菌性肺炎及支气管肺炎；
- 3、生殖泌尿道感染：如膀胱炎、尿道炎、肾盂肾炎；
- 4、皮肤及软组织感染：如疖、脓肿、蜂窝织炎、外伤感染；
- 5、骨和关节感染：如骨髓炎；
- 6、其他感染：如腹腔感染等。

人群	推荐用量	给药频次
体重超过40公斤的成人和12岁以上青少年	2.2g	每12小时给药一次 (严重感染每8小时给药一次)
体重低于40kg的儿童	3个月及以上儿童	55mg/kg 每8小时给药一次
	3个月以下或体重低于4kg 婴儿	55mg/kg 每12小时给药一次
肾功能不全患者	肌酐清除率 (CrCl) 大于30ml/min	2.2g 每12小时给药一次 (严重感染每8小时给药一次)
	肌酐清除率低于30ml/min	不建议使用本品

儿童肺炎基本情况：

肺炎是我国儿童死亡的主要原因之一，大部分儿童肺炎为CAP。CAP常有发热、咳嗽等表现，并有胸部X线片的异常改变。常见细菌：肺炎链球菌（SP）、金黄色葡萄球菌（SA）、流感嗜血杆菌（Hi）、卡他莫拉菌（MC）等。其中SP、SA、GA均可引起重症肺炎和坏死性肺炎，特别是MRSA，该菌感染病死率较高。

参照药品：注射用氨苄西林钠舒巴坦钠，理由如下：

1. 参照药为社区获得性肺炎治疗一线用药
2. **3期临床对照药物，疗效相当**
3. 参照药与本品均为注射用青霉素类/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂，**作用机理一致，抗菌谱相近**，亦可用于中、重度等不同感染程度的治疗。
4. 参照药品的给药剂量和给药方式有PK/PD数据支撑。

■ 选择依据：① 感染领域治疗指南：《2019ATS / IDSA临床实践指南》、《成人社区获得性肺炎的诊断和治疗》、《急诊成人社区获得性肺炎诊治专家共识》；② 药品使用说明书

与参照药的比较优势——安全性更优

应用参照药治疗时常见贫血、血小板减少症、嗜酸粒细胞增多症、静脉炎等血液及淋巴系统疾病的不良反应

使用本品可有效降低该类不良反应



EUROPEAN MEDICINES AGENCY
SCIENCE MEDICINES HEALTH

ANNEX II

SCIENTIFIC CONCLUSIONS AND GROUNDS FOR AMENDMENT OF THE SUMMARIES
OF PRODUCT CHARACTERISTICS, LABELLING AND PACKAGE LEAFLET
PRESENTED BY THE EMEA

阿莫西林

克拉维酸

CPS POSITION STATEMENT

Management of acute otitis media in
children six months of age and older

Nicole Le Saux, Joan L Robinson; Canadian Paediatric Society, Infectious Diseases
and Immunization Committee



Canadian
Paediatric
Society

Français en page 45

■ 不良反应发生率低，多数症状少见、轻微

常见 ($\geq 1/100$ 至 $< 1/10$) 的不良反应为：皮肤粘膜念珠菌病、腹泻；

不常见 ($\geq 1/1000$ 至 $< 1/100$) 的不良反应为：

头晕、头痛、恶心、呕吐、消化不良、AST和/或ALT升高、皮疹、瘙痒、荨麻疹。

上市至今未收到不良反应反馈

未发布过任何安全性警告、黑框警告、撤市等相关信息



■ 10:1全新配比，有效避免克拉维酸过量，降低肝损伤风险、减少腹泻发生

克拉维酸可能是引起腹泻和胆汁淤积性肝炎的主要原因，已有研究提示克拉维酸是导致阿莫西林克拉维酸钾肝毒性反应的致病组分，**降低克拉维酸**的比例，**可降低**阿莫西林克拉维酸复方的**肝毒性**。

● 加拿大儿科学会-感染病与免疫委员会发布的《六个月及以上儿童急性中耳炎治疗指南》指出：

与腹泻风险较高相关的克拉维酸，儿童用量不应超过10mg/kg/天。

● EMA (欧洲药品管理局) 报告指出应提高阿莫西林剂量，限制克拉维酸剂量：

- 在耐药菌流行率较高的地区或感染严重的情况下，适合使用更高剂量的阿莫西林
- 策略是阿莫西林的剂量提高，克拉维酸钾剂量保持不变
- 删除5:1单独添加阿莫西林的用法，因为10:1提供了合适的替代方案
- 克拉维酸钾每天剂量**不能超过600mg**



01、抗菌谱更广


数据来源：《国家抗微生物治疗指南》（第3版）；华山医院，2014；《热病》

新泰恬®不仅对临床常见阳性菌和阴性菌有效，同时可覆盖青霉素不敏感肺炎链球菌。

- 敏感菌低于30% /不适合选择
- 敏感率30%-60% /中介
- 敏感菌超60%

细菌	阿莫西林钠克拉维酸钾 (10:1)	阿莫西林钠克拉维酸钾 (5:1)	氨苄西林/舒巴坦
肺炎链球菌			
青霉素中介肺炎链球菌		■	
化脓链球菌			
粪肠球菌			
流感嗜血杆菌			
卡他莫拉菌			
肺炎克雷伯菌			
大肠埃希菌			
脆弱拟杆菌			


02、%T > MIC将会明显延长，抗菌效果增强



阿莫西林/克拉维酸是时间依赖性抗生素，其杀菌作用主要取决于浓度高于细菌MIC的时间。阿莫西林剂量由1g增加到2g，Cmax没有增加，AUC明显增加，%T > MIC将会明显延长，抗菌效果增强。

注：时间依赖型的抗菌药物的杀菌作用主要取决于浓度高于细菌MIC的时间，PK/PD评价指标为T>MIC


数据来源：GSK原研数据



03、临床总有效率高达 96.7%，细菌总清除率 94.1%

早期研究

瑞士开展了一项对Agmentin注射和口服序贯治疗呼吸道感染、尿路感染、盆腔炎、败血症、皮肤和皮下感染的开放性临床研究，结果 249个受试者的**临床总有效率为 96.7%，细菌总清除率为 94.1%，不良反应发生率低。**




04、细菌清除率高达 94.4%，综合治愈率高达 88.9%

三期临床


复旦大学附属华山医院抗生素研究所牵头的34家中心（涉15个省份、324例患者）的随机对照临床研究显示：

- FAS人群停药后7-14天**细菌清除率高达 94.4%，综合治愈率高达 88.9%。**
- 其中较对照组，肺炎链球菌细菌清除率涨幅 7%，肺炎克雷伯菌细菌清除率较对照组涨幅 20%。

数据来源：III期临床研究



05、总有效率95.5%，显著高于哌拉西林/舒巴坦^[1]




一项阿莫西林/克拉维酸对比哌拉西林/舒巴坦治疗儿童肺炎的观察性研究，纳入1200例肺炎患儿，对照组予以哌拉西林舒巴坦钠进行治疗，试验组予以阿莫西林克拉维酸钾进行治疗。

研究组总有效率为95.5%，显著高于对照组的84%。

[1]王凤雨.阿莫西林钠克拉维酸钾治疗小儿肺炎的效果及安全性分析[J].世界最新医学信息文摘,20219,19(A3):180.

06、总有效率96.7%，显著高于头孢呋辛^[2]

阿莫西林/克拉维酸组**总有效率为96.4%，显著高于对照组的89.1%。**阿莫西林/克拉维酸组的退热时间、啰音消失时间、止咳时间、咽喉及扁桃体充血消失时间均显著低于对照组。取220例肺炎患儿，随机分为研究组和对照组各110例，对照组采用头孢呋辛钠静脉滴注，研究组采用阿莫西林克拉维酸钾静脉滴注。



[2]胡汉军,叶志华.阿莫西林克拉维酸钾治疗儿童肺炎的临床疗效及安全性分析[J].中国医刊,2015,50(02):104-106..

国内外多权威指南联合推荐 阿莫西林克拉维酸钾 用于：
经验性治疗呼吸道感染

01.

✓ **国家抗菌药物临床应用指导原则（2015版）**

阿莫西林/克拉维酸被推荐用于需要住院的CAP患者、需要入住ICU的无基础疾病青壮年罹患重症CAP的患者、吸入性肺炎；肺炎链球菌、流感嗜血杆菌的病原治疗



✓ **中国成人社区获得性肺炎诊断和治疗指南（2016）**

阿莫西林/克拉维酸被推荐用于各类感染性疾病的的经验性初始治疗；推荐在经颈静脉肝内门腔静脉分流术（TIPS）预防性使用不超过24小时

✓ 《国家抗微生物治疗指南》（第3版）



✓ 感染性疾病指南《热病》



✓ 美国IDSA/ATS成人社区获得性肺炎诊疗指南（2019）

✓ 慢性阻塞性肺疾病急性加重抗感染治疗中国专家共识（2019）

✓ 中国急诊重症肺炎临床实践专家共识（2016）

✓ 中国儿童咳嗽诊断与治疗临床实践指南（2021版）

✓ 美国感染疾病协会（IDSA）儿童及成人急性细菌性鼻窦炎临床实践指南（2012）

国内外多权威指南联合推荐 阿莫西林克拉维酸钾 用于：

儿童上呼吸道感染、CAP、早发性HAP、泌尿系统感染、中耳炎

02.

- ✓ 儿童社区获得性肺炎诊疗规范 (2019)
- ✓ 儿童社区获得性肺炎管理指南 (2013修订版)
- ✓ 儿童医院获得性肺炎管理方案 (2010)
- ✓ 美国感染疾病协会 (IDSA) 儿童及成人急性细菌性鼻窦炎临床实践指南 (2012)
- ✓ 美国儿童细菌性上呼吸道感染抗生素合理使用原则 (2013)
- ✓ 英国儿童社区获得性肺炎管理指南 (2011)
- ✓ 欧洲儿童泌尿系统感染指南 (2015)
- ✓ 中国儿童咳嗽诊断与治疗临床实践指南 (2021版)

✓ 《国家抗微生物治疗指南》 (第3版)



推荐阿莫西林/克拉维酸作为成人及儿童感染经验性治疗；

对于病原治疗，流感嗜血杆菌：轻中度感染首选；卡他莫拉菌；MSSA, MSCNS；嗜血艾肯菌：首选；犬咬二氧化碳嗜纤维菌：犬咬后无脾患者预防用药；类志贺邻单胞菌；消化链球菌；脆弱拟杆菌

- 国内全新配比10:1，避免克拉维酸过量，可降低腹泻发生率、降低肝损伤风险，更适合肝功能异常等特殊人群。
- ✓ 更适用于**儿科感染**：抗菌谱覆盖儿科各种感染中的常见致病菌，且抗菌活性强，耐受性好；
- ✓ 应用参照药治疗时常见贫血、血小板减少症、嗜酸粒细胞增多症、静脉炎等血液及淋巴系统疾病的不良反应，使用本品可有效解决该问题，同时**降低费用**，经济性更优；
- ✓ 为**中重度感染**患者提供更优治疗方案；
- ✓ 国家3类新药；
- ✓ 一天2次，降低给药频次，减少占用静脉通道。

对公共健康有积极影响

- 1、有效治疗中重度等不同程度感染的同时，**安全性更高**，提高患者生活质量，提高患者健康水平；
- 2、使用人群明确，为**中重度**患者提供**更优选择**；
- 3、**儿童患者最优选择**。

符合“保基本”原则

- 1、药品费用水平与基本医疗保险基金总额和参保人承受能力相适配；
- 2、有效提高医疗卫生水平，增加抗菌有效性，提高患者生命质量，有效降低治疗时间，**减少医保基金支出**。

公平性

可弥补现有目录短板

- 1、**弥补儿童中重度感染用药缺口**；
- 2、减少贫血、血小板减少症、嗜酸粒细胞增多症等不良反应，为敏感细菌所引起的多种感染的患者提供更多，更优的治疗选择。

临床管理难度低 明显提升医疗服务效率

- 1、一天2次，降低给药频次，减少占用静脉通道；
- 2、**适应症明确**，临床指征易于辨别，处方明确，便于监管；
- 3、10:1配比更好满足临床使用需求，**临床使用便利**；
- 4、抗菌药物实行分级管理，临床应用要求严格，**不存在滥用风险**。

感谢观看

注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(II)

深圳华润九新药业有限公司
(华润三九旗下企业)

